

NAVODILA ZA UPORABO KAPLJIC ATROPINA

Spoštovani starši!

Kapljice Atropina vašemu otroku niso predpisane kot zdravilo, temveč kot priprava na pregled za določitev dioptrije.

Kapljice Atropina začnete kapljati otroku v obe očesi dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer) 3 dni pred dogovorjenim datumom pregleda in tudi zjutraj na dan pregleda. V vsako oko kapnite 1 kapljico.

Kapljice Atropina so označene kot strup. Strupene so le, če jih otrok zaužije, zato jih hranite na varnem, otroku nedostopnem mestu! Po končanem pregledu stekleničko izpraznite v odtok in jo prazno odvrzite v smeti.

Kapljice Atropina očem niso škodljive. Razširijo zenico in ohromijo očesno mišico, ki sodeluje pri prilagajanju očesne leče za gledanje na bližino (akomodaciji). Tako nam omogočijo določitev pravilne dioptrije.

Otroku se bo po uporabi kapljic Atropina nekaj dni bleščalo na močnejši svetlobi, zato ga v sončnem vremenu zaščitite s sončnimi očali. Nekaj dni bo tudi slabše videl na bližino.

Posamezni otroci so na kapljice Atropina lahko občutljivi. Oči postanejo pordele, pordijo in otečejo lahko veke. Izjemno redko lahko pride pri uporabi kapljic Atropina tudi do sistemske zastrupitve. Znaki zastrupitve so zardevanje v obraz, hitro bitje srca, suha usta, vročina, slabost, vrtoglavica in zmedenost. Mlajši otroci lahko dobijo izpuščaj po telesu.

V takšnem primeru TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO KAPLJIC ATROPINA in obvestite nas ali vašega pediatra. Blagi stranski učinki Atropina izginejo sami, hujše oblike zastrupitev pa zdravimo s protistrupom. V primeru, da v oko po nesreči kapnete več kot 2 kapljici Atropina, oko sperite z vodo.

Vaš oftalmolog

Simon Trpin, dr. med.